Suivi du trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique

Dossier de
 la rÃ©daction de H2o
September 2026

Le 16 septembre marque la JournÃ©e internationale des Nations unies pour la prÃ©servation de la couche d'ozone. Le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique atteint gÃ©nÃ©ralement son extension maximale entre la mi-septembre et le dÃ©but octobre. Cette annÃ©e, dÃ¨s la fin du mois d'aoÃ»t, sa superficie Ã©tait dÃ©jÃ supÃ©rieure Ã celle de l'Antarctiqu trou s'est ensuite rapidement agrandi, atteignant environ 25 millions de km2 le 12 septembre, environ 5 millions de km2 de plus que la moyenne pour cette pÃ©riode de l'annÃ©e. Les prÃ©visions du service de surveillance de l'atmosphÃ¨re de Copernicus (CAMS) indiquent que l'Ã©tendue du trou pourrait encore s'accroÃ®tre.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Â

NÃ©anmoins, le Bulletin de l'OMM sur l'ozone et le rayonnement, publiÃ© le 16 septembre, indique que le trou dans la couche d'ozone observÃ© l'an dernier (en 2025) s'est classÃ© parmi des plus petits trous relevÃ©s depuis les Ã©pisodes de for appauvrissement constatÃ©s en 1992. Tant la profondeur que l'Ã©tendue du trou dans la couche d'ozone ont Ã©tÃ© nettement infÃ©rieures Ã la moyenne de la pÃ©riode 1990-2010.

Les fluctuations d'une annÃ©e Ã l'autre sont influencÃ©es par les conditions de transport mÃ©tÃ©orologique Ã grande Ã©chel qui favorisent l'appauvrissement printanier de l'ozone quasiment Ã chaque hiver austral au-dessus de l'Antarctique et tous les 5 Ã 10 ans dans l'hÃ©misphÃ¨re Nord.

OMMÂ