## La fonte des glaces au Groenland inquiÃ"te les scientifiques

Dossier de<br/>
de /> la rédaction de H2o

La vague de chaleur en Sibérie, conjuguée à une fonte précoce des glaces au Groenland, ravive les préoccupations de communauté scientifique à l'approche de l'été dans la région arctique. Le début de la saison de la fonte des glaces au Groenland - défini comme le moment où celle-ci s'étend sur au moins 5 % de la calotte glaciaire - a été enregistrà mai, selon l'Institut météorologique danois (DMI). Soit avec près de deux semaines d'avance par rapport à la date médiane issue de 40 ans de données, a expliqué Martin Stendel, chercheur au DMI. En 2019, la saison des fontes avait débuté le 30 avril, mais un début précoce comme cette année reste une source d'inquiétude, selon les scientifiques. Groenland va entrer dans la saison dite d'ablation - lorsque les chutes de neige ne compenseront plus la fonte - entraînant un rétrécissement général de la calotte glaciaire avec un niveau de glace déjà faible dû au peu de neig tombé pendant l'hiver.

Les chercheurs du DMI ont également noté une vague record de chaleur en Sibérie occidentale en mai. En utilisant ce qu'on appelle la réanalyse, M. Stendel explique que son équipe n'avait pas observé une telle vague de chaleur depuis une soixantaine d'années pour cette période de l'année. Durant la dernià re décennie, plusieurs vagues de chaleur ont été observées dans certaines parties de l'Arctique et à différentes périodes de l'année. Ce qui se passe aujourd'hui pas sans précédent, mais c'est quand même assez inhabituel", explique M. Stendel. Il rappelle l'importance de garder un œil sur la région où d'énormes quantités de gaz à effet de serre sont piégées sous la glace du permafrost.

Les températures moyennes dans la région arctique ont augmenté de deux degrés depuis le milieu du XIXe siècle, soit deux fois plus que la moyenne mondiale.

Le Devoir